

Obličkový reflux a reflux obličkovej panvičky vpravo, sekundárne zmrštená oblička. Chronická nefritída, akútny stav. Hydronefróza II. stupňa, vľavo

9-ročný chlapec sa liečil v stredisku SKENAR v Rusku počas 10 dní na obličkový reflux a reflux obličkovej panvičky vpravo, sekundárne zmrštenú obličku, chronickú nefritídu vľavo, akútny stav. Hydronefróza II. stupňa, vľavo.

Najprv chlapec bol na vyšetrení a liečení v nemocnici, efekt od vykonanej liečby bol nepatrným, otázka etiológie zmrštenia pravej obličky zostala nevyriešenou. Predpokladá sa vrodená anomália rozmerov pravej obličky. V stredisku bola vykonaná SKENAR terapia pri použití magnetickej deky. Liečba trvala 10 dní. Počas liečby každé 2 dni bol kontrolovaný stav obličiek podľa Folla, do úvahy sa bral pitný režim a meranie teploty denne. Celkový zdravotný stav pacienta sa zlepšil po prvej terapii. K druhej terapii sa upravil pitný režim (podiel vypitej a vylúčenej vody). Pri šiestej terapii obličky fungovali normálne. Teplota sa normalizovala k 3. terapii bez použitia antibiotík k okamihu liečby. Po absolvovaní terapie bolo urobené SONO obličiek, rozmery ľavej obličky sa upravili, pravá oblička nadobudla jasné obrysy. Chemická analýza moču bola bez patológie. Navrhnutá exkretčná urografia na určenie funkčnej schopnosti pravej obličky



Vyšetrenie SONO



Lekárska správa SONO



Vyšetrenie SONO



Vyšetrenie SONO



Lekárska správa SONO